



VAKCINA PROTIV COVIDA-19

Opšte informacije o vakcini protiv COVIDA-19

Da li je vakcina efikasna i sigurna?

Za svaku vakciju u Švajcarskoj je potrebna dozvola i preporuka. U tu svrhu vakcina mora da ispunjava visoke standarde u pogledu sigurnosti, efikasnosti i kvaliteta. Švajcarska agencija za lekove Swissmedic je precizno ispitala i odobrila vakciju protiv COVIDA-19. Sigurna je i efikasna. Već je više desetina hiljada ljudi dobilo vakciju tokom studija. Sigurna je i efikasna i kod starijih ljudi i hroničnih bolesnika. Otkako je odobrena vakcina, nekoliko miliona ljudi je vakcinisano sa tom vakcijom. Do sada ne postoji ništa upadljivo u vezi teških nuspojava, niti u studijama, niti u programima za vakciju. Stručnjaci i dalje nadzire sigurnost i efikasnost vakcine.

Načelno važi: Rizik od ozbiljnih neželjenih reakcija posle vakcinacije je mnogo manji od opasnosti od ozbiljnog razvoja bolesti posle infekcije korona virusom.

Ko će se prvo vakcinisati?

U Švajcarskoj će se prvo vakcinisati osobe za koje je COVID-19 posebno opasan: To su osobe starije od 65 godina i odrasle osobe sa određenim hroničnim bolestima. S obzirom da je raspoloživa količina vakcina na početku ograničena, termin za vakcinaciju će prvo dobiti osobe starije od 75 godina i osobe sa hroničnim bolestima koje imaju najveći rizik od ozbiljnog razvoja COVIDA-19. Nakon toga će biti vakcinisano zdravstveno osoblje i osoblje koje pazi veoma ugrožena lica. Posle dobijaju osobe koje su u bliskom kontaktu vakciju. To znači: osobe koje žive zajedno sa veoma ugroženim ljudima ili se privatno brinu o njima.

Gde i kada mogu da se vakcinišem?

Savezna vlada je izradila strategiju vakcinisanja i preporuke. Za vakcinaciju su nadležni kantoni. Informišite se na internet stranici ili putem Infoline-a vašeg kantona www.foph-coronavirus.ch/cantons (engleski) koje se grupe osoba trenutno vakcinišu i gde. Možete i pitati vašeg doktora, vašu doktorku, vašu apotekarku ili apotekara.

Ko ne bi trebalo da se vakciniše?

Vakciju protiv COVIDA-19 ne preporučujemo sledećim osobama:

- osobe sa ozbiljnom potvrđenom alergijom na neki sastojak vakcine, pre svega na polietilen glikol (PEG),
- deca i mladi ispod 16 godina. Još uvek nema dovoljno podataka o vakcinaciji za ovaj uzrast.

Ne postoji dovoljno podataka o vakcini u trudnoći.

Trenutno ne preporučujemo generalno vakcinisanje trudnica. Ukoliko postoje određene hronične bolesti sa većim rizikom u vezi teškog COVID-19 oboljenja, vakcina može ipak biti značajna. Ako ste trudni i imate hroničnu bolest, obratite se vašem doktoru ili vašoj doktorki.

Molimo da imate u vidu: Da li imate visoku temperaturu?

Da li ste bolesni i ne osećate se dobro? U tom slučaju odložite termin za vakcinaciju.

Da li čekate na vaš rezultat testa na COVID-19? Ili ste u izolaciji ili karantinu? U tom slučaju nemojte da se vakcinišete. Nadoknadite vakciju kada bude moguće.

Kako se daje vakcina?

Putem injekcije u nadlakticu.

Koliko često moram da se vakcinišem?

Potrebne su dve vakcine. Drugu vakciju možete da primite četiri nedelje posle prve.

Važno je znati: Morate da primite obe vakcine.

Samo tada ste najbolje moguće zaštićeni.

Kako me vakcina štiti?

Vaš organizam izgrađuje zaštitu od COVIDA-19. To traje do otprilike nedelju dana do dve nedelje posle druge vakcine. Vakcina jača vaš odbrambeni mehanizam. Ona pomaže vašem organizmu da se bori protiv virusa. Rizik dobijanja COVIDA-19 je veoma nizak.

Važno je znati: Potpuna zaštita ne postoji. Neke osobe mogu da dobiju COVID-19 uprkos vakcini. Sa vakcijom postoji međutim veća šansa da se ne razbolite ozbiljno. Ovde možete pronaći detaljnije informacije o načinu funkcionisanja vakcine:

www.foph-coronavirus.ch/mrna (engleski)

OVAKO ĆEMO SE ZAŠTITITI.



Koliko dugo me vakcina štiti?

To se još ne zna. Stručnjaci trenutno ispituju koliko dugo traje zaštita vakcinom. Moguće je da će kasnije još jedna vakcina biti potrebna.

Da li zbog vakcine mogu da dobijem COVID-19?

Ne. Vakcina ne može da bude uzročnik oboljevanja od COVIDA-19. U vakcini nema korona virusa.

Molimo da imate u vidu: Pre i posle svake vakcinacije i dalje treba da se pridržavate pravila higijene i ponašanja.

Dali treba da primim vakcinu ako sam imao/imala COVID-19?

Vakcina ima smisla i ukoliko ste već imali COVID-19. Tako ste nekoliko nedelja posle bolesti zaštićeni od nove zaraze. Preporučujemo vakcinvu od tri meseca posle bolesti nadalje.

Da li postoje neželjene reakcije?

Svaka vakcina može da prouzrokuje nuspojave. Uglavnom su slabog intenziteta i brzo prolaze. Veoma retko dolazi do pojave ozbiljnih nuspojava. Kod pojedinih osoba je došlo do ozbiljne alergijske reakcije direktno posle primanja vakcine. Osim toga do sada ne postoje upadljive teže nuspojave. Takve nuspojave bi se očekivale u roku od nekoliko meseci nakon vakcine. Stručnjaci veoma oprezno posmatraju moguće pojave.

Koje nuspojave su moguće?

- Crvenilo, bol ili otok na mestu uboda na ruci gde ste vakcinisani
- Glavobolja
- Zamor
- Bolovi u mišićima i zglobovima
- Opšti simptomi kao što su groznica, osećaj groznice ili manja temperatura.

Ove neželjene reakcije se često javljaju posle vakcinacije. One pokazuju da organizam izgrađuje zaštitu protiv bolesti. U blažem obliku su čak dobar znak. U slučaju alergijske reakcije dolazi, na primer, do pojave jakog otoka, crvenila, svraba ili otežanog disanja. Ukoliko se pojave ovi simptomi, odmah se obratite svom lekaru.

Koliko dugo mogu da traju nuspojave?

Neželjene reakcije uglavnom prolaze posle nekoliko dana. Da li posle nedelju dana i dalje imate neželjene reakcije? Da li postaju gore? Ili ste možda zabrinuti? U tim slučajevima razgovarajte sa svojim lekarom.

Šta treba da radim posle vakcinacije?

Dobili ste prvu vakcinvu. Odmah zakažite termin za drugu vakcinvu otprilike četiri nedelje kasnije.

Molimo vas da ne zaboravite: I dalje se pridržavajte pravila higijene i ponašanja.

Vakcinisan sam. Da li mogu da zarazim druge ljude COVIDOM-19?

Vakcina vas štiti od COVIDA-19. Međutim, još uvek nije poznato da li vakcina sprečava zarazu. To znači da može da se desi da, uprkos vakcini i nepostojanju simptoma, zarazite druge ljude. Zbog toga se i dalje pridržavajte pravila higijene i ponašanja.

Ko plaća vakcinaciju?

Vakcinacija je besplatna za vas. Zdravstveno osiguranje plaća jedan deo vakcine. Konfederacija i kantoni plaćaju ostalo.

Da li je vakcinacija dobrovoljna?

Da. Vakcinacija je u Švajcarskoj dobrovoljna. Obavezna vakcinacija nije predviđena.

Gde mogu da pronađem dodatne informacije?

Dodatne informacije o vakcinaciji protiv COVIDA-19 možete pronaći na internet stranici Savezne službe za javno zdravlje BAG:

www.foph-coronavirus.ch/vaccination (engleski)
Ili pitajte svog lekara. Ili u apoteci.

